

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考
平成26年8月27日	コルト顆粒水和剤	削除	だいこん	旧ラベル流通無し
平成26年11月17日	オルトラン粒剤	削除	ミニトマト	詳細変更内容別添
			はつかだいこん	
		適用変更	キャベツ	
			トマト	
			きゅうり	
			なす	
			ピーマン	
			はくさい	
			ブロッコリー	
			だいこん	
	かぶ			
	ばれいしょ			
	オルトラン水和剤	削除	なす	詳細変更内容別添
			ブロッコリー	
			だいこん	
			はつかだいこん	
			かぶ	
			トマト	
			ミニトマト	
	かんきつ			
適用変更	適用変更	キャベツ	詳細変更内容別添	
		はくさい		
		レタス		
		ばれいしょ		
		ぶどう		
		かき		
		茶		
オクラ				
作物名変更	作物名変更	非結球あぶらな科葉菜類	詳細変更内容別添	
		とうもろこし		
ジェイエース粒剤	削除	ミニトマト	詳細変更内容別添	
		適用変更		
	適用変更	キャベツ		
		はくさい		
		ブロッコリー		
		だいこん		
		かぶ		
		なばな		
		きゅうり		
		トマト		
		なす		
		みずな		
		ばれいしょ		
こまつな				
チンゲンサイ				
ジェイエース水溶剤	削除	かんきつ	詳細変更内容別添	
		ブロッコリー		
		だいこん		
		かぶ		
		トマト		
		ミニトマト		
		なす		
	適用変更	適用変更		かき
				ぶどう
				キャベツ
はくさい				
レタス				
チンゲンサイ				
みずな				
オクラ				
ばれいしょ				
茶				

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考			
平成27年2月4日	ジメエート乳剤	削除	みかん				
			なつみかん				
			かんきつ (みかん、なつみかんを除く)				
			はくさい				
			トマト				
			ピーマン				
			かぼちゃ				
			しろうり				
			かぶ				
			にんじん				
			ねぎ				
			にら				
			たまねぎ				
			さやいんげん				
			ジメエート粒剤		削除	だいこん	
なす							
ねぎ							
だいず							
わさび							
ベジホン乳剤	削除	キャベツ					
		はくさい					
		だいこん					
平成27年2月18日	マイクロデナボン水和剤85	削除	ぶどう はくさい				
	デナボン水和剤50	削除	ぶどう				
	ルビゲン水和剤	削除	トマト もも				
	スペックス水和剤	削除	もも				
	マブリック水和剤20	削除	大粒ぶどう				
			トマト				
		適用変更	レタス		詳細変更内容別添		
	マブリックEW	削除	大粒ぶどう				
マブリックジェット	削除	トマト					
平成27年7月8日	ガゼット粒剤	削除	なす				
			きゅうり				
			すいか				
			メロン				
			とうがん				
			だいこん				
			いちご				
			ねぎ				
			かんしょ				
			キャベツ				
			はくさい				
			ブロッコリー				
			ばれいしょ				
			アドバンテージ粒剤		削除	なす	
						きゅうり	
	すいか						
	メロン						
	とうがん						
	アドバンテージS粒剤	削除	だいこん				
			いちご				
ねぎ							
オンコルスタークル粒剤	削除	かんしょ					
		だいこん					
		ねぎ					
		きゅうり					
			なす				
			メロン				

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考
平成27年7月8日	オンダイアエース粒剤	削除	キャベツ	
			はくさい	
			ブロッコリー	
			ばれいしょ	
			ねぎ	
			すいか	
			メロン	
			なす	
	オンコルマイクロカプセル	削除	キャベツ	
			はくさい	
			ブロッコリー	
			カリフラワー	
			レタス	
			非結球レタス	
			ねぎ	
			わけぎ	
	オンコル粒剤1	削除	キャベツ	
			きゅうり	
			すいか	
			メロン	
			なす	
			ねぎ	
			はくさい	
	オンコルOK粒剤	削除	かんしょ	
とうがん				
オクラ				
グランドオンコル粒剤	削除	きゅうり		
		キャベツ		
		ねぎ		
ジャッジ箱粒剤	削除	きゅうり		
		キャベツ		
		ねぎ		
オンコル粒剤5 ガーデンホスピタル粒剤	削除	きゅうり		
		すいか		
		メロン		
		なす		
		ピーマン		
		なばな		
		キャベツ		
		はくさい		
		だいこん		
		ブロッコリー		
		カリフラワー		
		レタス		
		ねぎ		
		わけぎ		
		ほうれんそう		
		とうがん		
		いちご		
平成27年10月14日	サイハロン水和剤	削除	かき	
			ぶどう	
			非結球レタス	
	サイハロン乳剤	削除	トマト	
			ミニトマト	
	ビリーブ水和剤	削除	かき	

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考	
平成27年10月28日	オサダン水和剤25	削除	いちご	最終有効年限超過	
	オサダンフロアブル	削除	いちご		
	カルビオ	削除	なし		
			ぶどう		
平成27年11月25日	アクセルフロアブル	適用変更	非結球レタス	詳細変更内容別添	
	サンマイトフロアブル	削除	トマト		
			ミニトマト		
平成28年4月20日	ロブラール水和剤	適用変更	ぶどう	詳細変更内容別添	
	ロブラール500アクア	削除	ぶどう		
平成28年10月19日	サンマイト水和剤	適用変更	りんご	詳細変更内容別添	
			もも		
			なし		
			ぶどう		
	いちじく				
	サンマイトフロアブル	適用変更	いちご	詳細変更内容別添	
平成28年11月2日	ラービン水和剤75	削除	りんご		
			もも		
		適用変更	なし		詳細変更内容別添
			キャベツ		
			はくさい		
	ラービフロアブル	削除	りんご		
			なし		
			かき		
		セルリー			
		適用変更	もも		詳細変更内容別添
	かんきつ				
	キャベツ				
	はくさい				
平成28年11月30日	コテツフロアブル	削除	非結球レタス		
			バナナ		
		適用変更	ぶどう		詳細変更内容別添
			ブロッコリー		
			非結球アブラナ科葉菜類		
	しゅんぎく				
平成29年10月25日	ハチハチ乳剤	削除	トマト		
					ミニトマト
					非結球レタス
					なす
		適用変更	レタス		詳細変更内容別添
			ブロッコリー		
			だいこん		
	ハチハチフロアブル	削除	トマト		
					ミニトマト
					なす
		適用変更	なし		詳細変更内容別添
			すもも		
			レタス		
アクセルキングフロアブル	削除	だいこん			
				非結球レタス	
	適用変更	レタス		詳細変更内容別添	

短期暴露評価に伴うアセフェート剤の登録変更一覧(登録変更日:平成26年11月17日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回数
オルトラン水和剤	キャベツ	ヨウムシ ハスモンヨウ タマナキシウワバ	1000~1500倍	/	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内				100~300L/10a	収穫30日前まで	1回	/	2回以内(定植時 までの処理は1 回以内、定植後 の散布は1回以 内)
		アオムシ コナガ アブラムシ類	1000~2000倍													
	はくさい	カブラハバチ ヨウムシ ハスモンヨウ	1000~1500倍	/	収穫14日まで	3回以内	散布	3回以内			1500倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	1回	/	1回
		アオムシ コナガ アブラムシ類	1000~2000倍													
	レタス	ヨウムシ	1000~1500倍	/	/	3回以内	散布	3回以内								
		オオタバコガ	1000倍													
	非結球あぶらな科葉 菜類(ケール、からし な、みずな、ルッコラ を除く)	アブラムシ類	1500倍	/	収穫21日前まで	1回	散布	1回								
	オクラ	アブラムシ類 ミドリコバエ	1000倍	/	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は4回 以内)				100~300L/10a	収穫開始7日前 まで	2回以内	散布	
	ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨウムシ		300倍	収穫7日前まで											
		アブラムシ類 ジャガイモガ	1000~1500倍	/	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内				100~300L/10a				
	とうもろこし	アブラムシ類	1000倍	/	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内								
	ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメコバエ	1500~2000倍	/	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫60日前まで	1回	/	1回
		ハマキムシ類	1500倍													
	かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1000~1500倍	/	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内			1500倍	200~700L/10a			/	
カキノハタムシガ カキノハタムシガ フジコナカイガラムシ		1000倍														
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ チャノコカクモンハマキ	1000~2000倍 1000~1500倍	/	摘採30日前まで	2回以内	散布	2回以内				200~400L/10a	摘採45日前まで	1回	/	1回	
オルトラン粒剤	キャベツ	アオムシ コナガ ヨウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	定植時及び 収穫21日前まで	3回以内	定植時植穴散布 及び 生育期葉面散布	3回以内					定植時	1回	植穴定植	2回以内(定植時 までの処理は1 回以内、定植後 の散布は1回以 内)
		アブラムシ類	6g/m ²													
	トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	定植時及び 収穫前日まで	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内					定植時	1回	作条散布 又は 植穴処理	1回
	きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ														
	ピーマン	アブラムシ類	2g/株	/											株元散布	
	はくさい	アオムシ コナガ ヨウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	定植時及び 収穫21日前まで		植穴散布及び 生育期株元散布								植穴処理	
	ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)	/	定植時及び 収穫14日前まで		株元散布									
	だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4kg/10a	/	は種前	1回	は種前 作条散布	2回以内(は種前 及びは種時の処 理は合計1回以 内)							作条散布	
	かぶ		4kg/10a	/	収穫14日前まで		株元散布	1回					収穫21日前まで			
	ばれいしょ	アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	植付時		作条散布	5回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は4回 以内)								3回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は2回 以内)

短期暴露評価によるアセフェート剤の適用変更一覧(登録変更日:平成26年11月17日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前登録内容								変更箇所									
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の総使用回数		
ジェイエース水溶剤	かき	カキカブアサミウマ チャノキアサミウマ カキノハタムシガ	1000~1500倍	200~700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内			1500倍							
	ぶどう	チャノキアサミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500~2000倍		収穫30日前まで	2回以内		2回以内						収穫60日前まで	1回		1回	
	キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タマキシウリハ	1000~1500倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内						収穫30日前まで	1回		2回以内(定植時 までの処理は1 回以内、定植後 の散布は1回以 内)	
	はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000~1500倍		収穫14日前まで			3回以内	1500倍							1回	1回	
	レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000~1500倍 1000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内										
	チンゲンサイ	アブラムシ類	1000倍		収穫21日前まで	1回		1回										
	みずな	アブラムシ類			収穫14日前まで	2回以内		2回以内(定植 時は1回以内)	1500倍					収穫21日前まで	1回			1回
	オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ	1000倍		収穫3日前まで	1回		1回							収穫開始 7日前まで			
	ばれいしょ	ヨトウムシ オオコシユウホシテントウ アブラムシ類			1000~2000倍 300倍	25L/10a		収穫7日前まで	4回以内	5回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は4 回以内)					収穫30日前まで	2回以内		3回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は2回 以内)
	茶	チャノキアサミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000~2000倍 1000~1500倍		200~400L/10a	摘採30日前まで		2回以内	2回以内						摘採45日前まで	1回		1回
ジェイエース粒剤	キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1株当たり1~2g)		/	定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで	3回以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3回以内					定植時	1回	植穴処理	2回以内(定植時 までの処理は1 回以内、定植後 の散布は1回以 内)	
		ハイマダラノメイガ	3~6kg/10a (1株当たり1~3g)			収穫21日前まで		生育期葉面散布		(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	(削除)			
	はくさい	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1株当たり1~2g)	定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで		3回以内	定植時植穴処理 及び 生育期株元散布	3回以内					定植時	1回	植穴処理	1回		
	ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当たり2g)	定植時及び生育期 但し、収穫14日前まで			株元散布											
	だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4kg/10a	は種前		1回	は種前作条散布	2回以内(は種 前及びは種時の 処理は合計1回 以内)							作条散布			
	かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫14日前まで			生育期葉面散布		1回					収穫21日前まで		株元散布		
	なばな		6kg/10a (1株当たり2g)	定植時		定植時 土壌混和处理								土壌混和处理				
	きゅうり	ホシツコナジラミ アサミウマ類 アブラムシ類	3~6kg/10a (1株当たり1~2g)	/		定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内					定植時	1回	作条散布 又は 植穴処理	1回	
	トマト	アブラムシ類 ホシツコナジラミ																
	なす	アブラムシ類 ホシツコナジラミ アサミウマ類																
みずな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	/	1回	定植時作条散布後 土壌混和	2回以内(定植 時は1回以内)							作条散布後 土壌混和				
ばれいしょ		3~6kg/10a	植付時			作条散布	5回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は4 回以内)								3回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は2回 以内)			
こまつな			は種前			は種前作条散布後 土壌混和	1回							作条散布後 土壌混和				
チンゲンサイ			定植時			定植時作条 散布後土壌混和												

短期暴露評価に伴うフルバリネット剤の登録変更一覧(登録変更日:平成27年2月18日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネットを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネットを含む農薬の総使用回数
マブリック水和剤20	レタス	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内					収穫7日前まで			

短期暴露評価に伴うメタフルミゾン剤の登録変更一覧(登録変更日:平成27年11月25日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
アクセルフロアブル	非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000~2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内					収穫7日前まで			

短期暴露評価に伴うイプロジオン剤の登録変更一覧(登録変更日:平成28年4月20日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
ロブラール水和剤	ぶどう	黒とう病	500~1000倍		開花期~幼果期 (収穫60日前まで)	3回以内	散布	3回以内			1000倍					

短期暴露評価に伴うクロルフェナピル剤の登録変更一覧(登録変更日:平成28年11月30日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所								
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	
コテツフロアブル	ぶどう	チャノキアサミウマ、 フタテンヒメコハイ、ミ カンキアサミウマ、 フトウサヒダニ	2000~4000倍	200~700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内									
		ナミハダニ、カンザワハ ダニ、ハスモンヨトウ、ト ビイロトラガ、モンキク ノメイガ、コガネムシ 類、ミノガ類	2000倍														
	ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウ ムシ、ハスモンヨトウ	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	1回		1回									収穫3日前まで
	非結球あぶらな 科葉菜類(こまつ な、ひろしまなを 除く)	コナガ	2000倍		収穫14日前まで												
	しゅんぎく	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで												2回以内

短期暴露評価に伴うトルフェンピラド剤の登録変更一覧(登録変更日:平成29年10月25日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所											
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農 薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農 薬の総使用回数				
ハチハチ乳剤	レタス	アブラムシ類、ナメグ リハエ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫14日前まで							
		ナメクシ類、べと病	1000倍																	
	ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ 類、コナガ	1000～2000倍		収穫3日前まで							収穫7日前まで								
		アオムシ、コナガ、アブ ラムシ類、キスジノミハ ムシ、ハイマダラノメイ ガ、ナメグリハエ、カ ブラハハチ	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内					2000倍	収穫30日前まで	1回			1回				
	かぶ	白さび病、ワッカ症	1000倍									削 除								
		キスジノミハムシ、コナ ガ	1000～2000倍		収穫7日前まで	2回以内					2000倍				1回		1回			
		ハイマダラノメイガ、ナ メグリハエ	2000倍								削 除									
	ねぎ	カブラハハチ、白さび 病	1000倍																	
		アザミウマ類、ネキコ ガ、シロイチモシヨト ウ、さび病、べと病	1000倍		収穫3日前まで	2回以内											収穫7日前まで			
	ピーマン	アザミウマ類	1000～2000倍																	
チャノホコリダニ、コナ ジラミ類、うどんこ 病		1000倍	収穫前日まで	2回以内									1回			1回				
ハチハチフロアブル	なし	シンクイムシ類	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	削 除											
		アブラムシ類、ニセナ シサビダニ、アザミウマ 類	2000倍										収穫30日前まで	1回		1回				
		クワコナカイガラムシ	1000～2000倍						2000倍											
	すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで										収穫14日前まで					
	レタス	アブラムシ類、ナメグ リハエ	1000～2000倍		収穫3日前まで	2回以内											収穫14日前まで			
		ヒメフタテンヨコバイ	1000倍																	
	非結球レタス	アブラムシ類、ナメグ リハエ	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内						2000倍					1回			1回
		ヒメフタテンヨコバイ	1000倍									削 除								
	セルリー	アブラムシ類、ナメグ リハエ	2000倍		収穫14日前まで	2回以内										収穫30日前まで				
	いちご	アブラムシ類、アザミ ウマ類、カキヒメヨコ バイ、うどんこ病	1000倍		収穫前日まで	2回以内											1番花の開花まで	1回		1回
アクセルキング フロアブル	レタス	オオタバコガ、アブラム シ類、ナメグリハエ	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回	散布	2回								収穫14日前まで				
		ヨトウムシ、ウワバ類	1500倍																	

短期暴露評価に伴うチオジカルブ剤の登録変更一覧(登録変更日:平成28年11月2日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所								
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブを含む農 薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブを含む農 薬の総使用回数	
ラービン水和剤75	なし	ナシチビガ、シンクイムシ類	1000～1500倍		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					収穫45日前まで	1回		1回	
		ハマキムシ類	1000倍														
		ケムシ類	1500倍														
ラービン水和剤75	キャベツ	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	1000～1500倍		収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内					収穫14日前まで				
		アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	1000～1500倍														
ラービフロアブル	もも	ハマキムシ類、シンクイムシ類	1000倍		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					収穫21日前まで				
		コアオハナムグリ、ケシキウイ類、ハスモンヨトウ、ナメクジ類、アザミウマ類	800倍														
		カタツムリ類	800～1000倍														
	ラービフロアブル	キャベツ	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	750～1000倍		収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内					収穫14日前まで			
			アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	750～1000倍													
	ラービフロアブル	はくさい	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	750～1000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫21日前まで			
ヨトウムシ			1000倍														
ラービフロアブル	だいこん	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000倍		収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫30日前まで				

短期暴露評価に伴うピリダベン剤の登録変更一覧(登録変更日:平成28年10月19日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所																					
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の 総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の 総使用回数														
サンマイト水和剤	りんご	リンゴハダニ	1000～3000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫21日前まで	1回		1回														
		ナミハダニ、リンゴサビダニ	1000～1500倍																											
	もも	アブラムシ類	1000倍														収穫3日前まで	2回以内	2回以内							収穫21日前まで	1回		1回	
		モモサビダニ、ハダニ類	1000～1500倍																											
	なし	ハダニ類、ニセナシサビダニ	1000～1500倍														収穫14日前まで	2回以内	2回以内								収穫21日前まで	1回		1回
		ミカンダニ	2000～3000倍																											
		アブラムシ類	1000～1500倍																											
ぶどう	ハダニ類	1000～1500倍	収穫45日前まで	1回	1回								収穫90日前まで																	
	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ	1000倍																												
なし	いちじく	ハダニ類、イチジクモンサビダニ	1000～1500倍		収穫7日前まで	1回	散布	1回					収穫45日前まで																	
サンマイトフロアブル	いちご	ハダニ類、ワタアブラムシ、チャノホコリダニ、シクラメンホコリダニ、コナジラミ類	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回					収穫3日前まで																	